

Avaliação da técnica intraoral de bichectomia: efeitos na face para finalidade estética.



Cintia F Souza¹; Caio V G Roman Torres² ; Angélica C Pimentel²; Heloisa F Marão²

1 – Aluna de graduação da Universidade Santo Amaro – UNISA, São Paulo.

2 – Professores do Mestrado em Implantodontia da Universidade Santo Amaro – UNISA, São Paulo.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de Bacharel em Odontologia da Universidade de Santo Amaro, São Paulo- SP

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem crescido o número de procedimentos para a remoção da bola de Bichat ou como frequentemente denominado, bichectomia. A remoção bola de Bichat pode ser utilizada como parte do procedimento terapêutico em casos de: fístulas buco sinusais, defeitos peri-orbitais, fissura palatal congênita, pacientes com bruxismo acentuado, pacientes com constantes lesões provocadas por mordidas na mucosa jugal e em pacientes que estão insatisfeitos com o contorno facial¹. Nos casos de afinamento do rosto, de lesões na mucosa jugal por mordida e bruxismo é realizado a remoção total ou parcial do corpúsculo, sempre levando em conta a harmonização facial². Indivíduos obesos, na maioria dos casos, apresentam o contorno facial arredondado. Alguns pacientes são submetidos a cirurgia bariátrica e o formato do rosto ainda continua arredondado, mesmo após o emagrecimento. Portanto, nesses casos a terapêutica de remoção da bola de Bichat, pode ser indicado para a harmonização facial³.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi demonstrar o procedimento de remoção da bola de Bichat com finalidade estética e seu respectivo pós-operatório em uma paciente que foi submetida à cirurgia bariátrica.

RELATO DE CASO CLÍNICO

- ✓ Bloqueio do nervo alveolar superior posterior e médio, e anestesia terminal infiltrativa em mucosa jugal;
- ✓ Identificar o ducto parotídeo e protegê-lo com o afastador de minessota;
- ✓ Incisão longitudinal de 2 cm de extensão na mucosa jugal e na altura do 2º molar, 1 cm posterior ao ducto parotídeo;
- ✓ Dissecção dos tecidos para separação da gordura do corpo adiposo da bochecha da sua cápsula;
- ✓ Remoção da porção bucal da bola de Bichat;
- ✓ Quando finalizado o procedimento cirúrgico de um lado, realizar o mesmo procedimento operatório do outro lado;
- ✓ Depois da remoção das bolas de Bichat, realizar mensuração volumétrica para verificar se foi removida a mesma quantidade dos dois lados;
- ✓ Ao término, realizar uma massagem compressiva bigital para prevenção de enfisema e hematoma;
- ✓ Sutura com ponto simples interrompido e aplicação de Taping (faixa de kinesiologia) para realizar compressão e prevenir o edema local.



Figura 1: incisão na mucosa jugal



Figura 2: bola de Bichat




Figura 3: remoção bola de Bichat




Figura 4: P.O imediato



Figura 5: P.O 6 dias/fitas de Kinesio®



Figura 6: P.O 30 dias



Figura 7: P.O 60 dias



Figura 8: P.O 90 dias

CONCLUSÃO

A técnica cirúrgica de remoção da bola de Bichat em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica resulta em afinamento da face e o uso da bandagem favoreceu o controle do edema no pós-operatório.

REFERÊNCIAS

- 1) De Lima Stevao, EL. Bichectomy or Bichatectomy: a small and simple intraoral surgical procedure with great face results. Dent & Oral Health 2015;1(1):555555.
- 2) Mohan M, Shetty T, Gupta P. Buccal Fat Pad. Arch of Dent and Med Res 2015;1(3):70-73.
- 3) Torres CVGR, Sani A, Cordeiro J, Filho SM, Pimentel AC. Bichat's Buccal Fat Pad Removal: Cheek Reduction Surgery. J Dent Health Oral Disord Ther 2017;(7)4:00250.